

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

神農本草經疏卷十三

詳校官太醫院恩糧_臣孔毓秀

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官進士_臣繆琪

校對官中書_臣吳俊

謄錄監生_臣宋大樽

欽定四庫全書

神農本草經疏卷十三

明 繆希雍 撰

總九十二種今疏其要者二十六種

桑根白皮

葉耳樞灰
枝黃附

竹葉

茹澀
附

吳茱萸

檳榔

梔子

騏驎竭

龍腦香

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

茗苦茶

山茱萸

紫葳

胡桐淚

猪苓

烏藥

沒藥

安息香

仙人杖

海桐皮

大腹

合歡

五倍子

天竺黃

蜜蒙花

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脈絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡出土上者殺人

疏○桑根白皮得土金之氣故味甘氣寒而無毒東垣海藏俱云兼辛然甘厚辛薄降多升少陽中陰也入手太陰經甘以固元氣而補不足辛以瀉肺邪之有餘故能止嗽也凡肺中有水氣及肺火有餘者宜之傷中者中氣傷也五勞者五臟勞傷也六極者六腑之中氣極也羸瘦者肌肉脫也崩中者血脫也脈絕者氣血兩虛之至故脈不來也之數者皆由陰不足則陽有餘陽有餘則火盛而內熱火與元氣不兩

立火能消物造化自然也惟甘也可以補元氣惟寒也可以除內熱熱除矣元氣生矣則上來諸證自瘳故本經終之以補虛益氣焉別錄去肺中水氣者即十劑中云燥可去溼桑白皮之屬是已吐血熱渴者熱傷肺火炎迫血妄行溢出上竅而兼發熱作渴也其主水腫腹滿臚脹者即利水道除溼補虛之功也溼熱盛則寸白生消除溼熱則蟲自不能留也縫金瘡者甘寒補益宜於傷損也

主治參互

得天麥二冬款冬花百部薄荷甘草沙參貝母枇杷
葉五味子為治嗽要藥 得芍藥薏苡仁木瓜茯苓
橘皮赤小豆為治水腫之神劑 經驗方治咳嗽吐
血甚者鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉
細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下 肘後
方治消渴尿多入地三尺桑根剉取白皮炙黃黑剉
以水煮濃汁隨意飲之亦可少入米勿用鹽 肘後

方治產後下血炙桑白皮煮水飲之 經驗方治墜

馬拘損桑根白皮五斤為末以水五升煎膏敷之便

止已後亦無宿血終不發動 子母秘方治小兒重

舌桑根白皮煮汁塗乳上飲之 聖惠方治小兒流

涎脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然汁飲之甚

效煎飲亦良 聖惠方治小兒天吊驚癇取家桑東

行根研汁服 千金方治石癰堅硬不作膿者桑白

皮陰乾為末煖膠和酒調傅以軟為度 蘇頌取皮

中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金
刀所傷慘痛須臾血止仍以白皮裹之甚良 時珍
取汁塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗 取枝燒瀝治大風瘡
疥生眉髮 子母秘錄治小兒鵝口桑皮汁和胡粉
塗之 聖惠方治小兒唇腫桑木汁塗之即愈 摘
玄方治破傷中風桑瀝好酒對和溫服以醉為度醒
服消風散

簡誤

肺虛無火因寒襲之而發咳嗽者勿服

桑葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

疏○葉本經無氣味詳其主治應是味甘氣寒性無
毒甘所以益血寒所以涼血甘寒相合故下氣而益
陰是以能主陰虛寒熱及因內熱出汗其性兼燥故
又能除腳氣水腫利大小腸原稟金氣故又能除風
經霜則兼得天地之清肅故又能明目而止渴髮者
血之餘也益血故又能長髮涼血故又止吐血合癰

口罨穿掌療湯火皆清涼補血之功也

主治參互

四月採桑葉酒拌九蒸九曝為末胡麻或黑芝麻去
殼九蒸九曝另磨如泥各等分煉蜜和為丸每五六
錢空心饑時白湯下能益氣血祛風仙家餌之為引
年止饑之要藥 普濟方治青盲洗法昔武勝軍宋
仲孚患此二十年用此法二年目明如故摘青桑葉
曬乾逐月按日就地上燒存性每以一合於甕器內

煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗正
月初八二月初八三月初六四月初四五月初六六
月初二七月初七八月二十九九月十二十月十三
十一月初二十二月三十 集簡方治風眼下淚臘
月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝 千金方治
頭髮不長用桑葉麻葉煮泔水沐之七日可長數尺
聖濟總錄治吐血不止晚桑葉焙乾研涼茶服三
錢只一服止後用補肝肺藥 直指方治癰口不斂

經霜黃桑葉為末傳之 通玄論治穿掌腫毒新桑
葉研爛罨之即愈 醫學正傳治湯火傷瘡經霜桑
葉燒存性為末油和敷之三日愈

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白沃血病癥瘕
積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白
者止久洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金
瘡 桑耳煨存性研細香附童便炒黑研細每用桑
耳灰二分香附末三分淡醋湯空心調服治血崩奇

效過於他木耳

桑椹味甘寒無毒單食止消渴陳藏器利五藏關節
通血氣久服不饑安魂鎮神令人聰明變白不老多
收暴乾為末蜜丸日服時珍搗汁飲解中酒毒釀酒

服利水氣消腫

一名文
武實

疏○桑椹者桑之精華所結也其味甘其氣寒其色
初丹後紫味厚於氣合而論之甘寒益血而除熱其
為涼血補血益陰之藥無疑矣消渴由於內熱津液

不足生津故止渴五臟皆屬陰益陰故利五臟陰不足則關節之血氣不通血生津滿陰氣長盛則不饑而血氣自通矣熱退陰生則肝心無火故魂安而神自清寧神清則聰明內發陰復則變白不老甘寒除熱故解中酒毒性寒而下行利水故利水氣而消腫皆自然之道也

主治參豆

寇宗奭曰本經言桑甚詳獨遺烏椹然桑之精英盡

在於此採摘微研以布濾汁石器熬成稀膏量入多
少蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯
點服治服金石藥發熱口渴生精神及小腸熱甚

僊方曰乾為末蜜和丸酒服亦良 四時月令云四

月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用桑椹汁三斗
重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑汁一
合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬
燒酒藏之經年味愈佳 普濟方治水腫脹滿水不

下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒
治之桑白皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取
五升以糯米飯五升釀酒飲 保命集治癰癰結核
文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以布取汁
銀石器熬成膏每白湯調服一匙日三服 千金方
治小兒赤禿桑椹子取汁頻服 聖濟錄治小兒白
禿黑椹入罌中曝三七日化為水洗之三七日神效
集簡方治陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天為細

末每服三錢熱酒下取汗

簡誤

甘寒帶滑故潤而下行脾胃虛寒作泄者勿服

桑柴灰味辛寒有小毒淋取汁與冬灰等分同減痣
疵黑子蝕惡肉煮赤小豆食大下水脹傳金瘡止血
生肌 桑霜即灰汁以桑皮綿紙襯淘羅底用滾水
淋下薺器盛之重湯煮乾別名木礪能鑽筋透骨為
傳癰疽拔疔引諸散毒藥攻毒之要品 得丹砂雄

黃乳香沒藥牛黃龍腦香紅白藥子白及白斂傳一
切腫毒止痛追毒有奇效 得鐵鏞蟾酥可拔疔

枝味苦平性不冷不熱主遍體風癢乾燥火氣脚氣
風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣欬嗽消食利小便療
癰疽後渴嫩條細搗一升熬香煎飲亦無禁忌久服
終身不患偏風 聖惠方治紫白癩風桑枝十斤益
母草三斤水五斗慢煮至五升去滓再煎成膏每臥
時溫酒調服半合以愈為度

桑黃氣味與白皮同其除肺熱之功殆又過之山家
老桑樹多生湖桑少見 同天門冬百部山梔枇杷
葉治赤鼻有神

竹葉味辛平大寒無毒主胸中痰熱欬逆上氣

疏○竹葉稟陰氣以生本經味辛平氣大寒無毒甄
權言甘寒氣薄味厚陰中微陽降也入足陽明手少
陰經陽明客熱則胸中生痰痰熱壅滯則欬逆上氣
辛寒能解陽明之熱結則痰自消氣自下而欬逆止

矣仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯無非假其
辛寒散陽明之邪熱也

主治參互

煎湯調酸棗仁炒熟末五錢臨臥服治心虛不得眠
同麥門冬酸棗仁遠志丹參茯神丹砂犀角治心
經蘊熱虛煩不眠 入白虎湯治傷寒煩熱大渴引
飲 肘後方治時行發黃竹葉五升小麥七升石膏
三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈

淡竹茹味甘微寒無毒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中
疏○竹茹雖與竹葉同本然竹茹得土氣多故味帶
甘氣微寒無毒入足陽明經經曰諸嘔吐酸水皆屬
於熱陽明有熱則為嘔哕溫氣寒熱亦邪客陽明所
致甘寒解陽明之熱則邪氣退而嘔哕止矣甘寒又
能涼血清熱故主吐血崩中及女勞復也

主治參互

同木瓜橘皮麥門冬枇杷葉人參蘆根汁石斛治胃

虛有熱嘔哕不止 活人書治傷寒愈後交接女勞
復頭痛身熱耳鳴口渴腰骨痛男子卵腫股痛竹皮
一升水三升煮五沸服汁 又方治婦人大病初愈
有所動勞致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀淡
竹青茹半斤枯樓二兩水二升分二服

簡誤

胃寒嘔吐及感寒挾食作吐忌用

淡竹瀝味甘大寒無毒療暴中風痺胸中大熱止煩

悶消渴勞復

疏○竹瀝竹之津液也經云大寒亦言其本性耳得火之後寒氣應減性滑流利走竅逐痰故為中風家要藥凡中風之證莫不由於陰虛火旺煎熬津液結而為痰壅塞氣道不得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不仁此藥能遍走經絡摻剔一切痰結兼之甘寒能益陰而除熱痰熱既祛則氣道通利經脈流轉外證自除矣其主胸中大熱止煩悶者取其甘

寒清熱益陰之功耳觀古人以竹瀝治中風則知中風未有不因陰虛痰熱所致不然如果外來風邪安得復用此甘寒滑利之藥治之哉

主治參互

同貝母栝樓仁霞天膏白芥子蘇子橘紅鬱金童便
麥門冬治似中風口眼喎斜語言蹇澀或半身不遂
等證 千金方治中風口噤竹瀝加薑汁日日飲之
梅師方治產後中風口噤身直面青手足反張以

竹瀝飲一二升即甦 外臺秘要治破傷中風凡閃
脫折骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發瘕口噤項
急殺人亟飲竹瀝二三升忌飲食及酒 千金方小
兒傷寒淡竹瀝葛根汁各六合細細與服 至寶方
小兒狂語夜後便發竹瀝夜服二合 產寶方婦人
胎動妊娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈 梅
師方孕婦子煩茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升
分三服 千金方時氣煩躁五六日不解青竹瀝半

盞煎熟數數飲之覆取微汗 李絳兵部手集欬嗽
肺痿大人小兒欬逆短氣胸中吸吸欬出涕唾嗽出
臭膿用淡竹瀝一合服之日三五次以愈為度

簡誤

寒痰溼痰及飲食生痰不宜用

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒
熱除溼血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實
不消中惡心腹痛逆氣利五藏

疏○吳茱萸稟火氣以生故其味辛氣溫有小毒甄權辛苦大熱氣味俱厚陽也入足陽明太陰兼入足少陰厥陰經凡脾胃之氣喜溫而惡寒寒則中氣不能運化或為冷實不消或為腹內絞痛或寒痰停積以致氣逆發欬五臟不利辛溫煖脾胃而散寒邪則中自溫氣自下而諸證悉除其主除溼血痺逐風邪者蓋以風寒溼之邪多從脾胃而入脾胃主肌肉為邪所侵則腠理閉密而寒熱諸痺所從來矣辛溫走

散開發故能使風寒溼之邪從腠理而出中惡腹痛
亦邪惡之氣干犯脾胃所致入脾散邪則腹痛自止
矣

主治參互

仲景吳茱萸湯治少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死
者吳茱萸一斤人參二兩生薑六兩大棗十二枚劈
四味以水七升煮二升去滓溫服七合日三服厥陰
乾嘔吐涎沫頭痛者同此方 又當歸四逆加吳茱

黃湯治厥陰證手足厥冷脈細欲絕其人內有久寒者當歸三兩芍藥三兩炙甘草二兩通草二兩桂枝三兩細辛三兩生薑半斤吳茱萸二升大棗二十五枚以水六升清酒六升同煮取五升去滓分五服食療治冬月感寒吳茱萸五錢煎湯服之取汗 聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷用吳茱萸一升酒拌溼絹袋二箇包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累有效 肘後方治寒疝往來吳茱萸一兩生薑半

兩清酒一升煎分溫服 聖惠方治食已吞酸胃虛

冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑等分為末湯服一錢

孫氏存仁方治多年脾泄老人多此謂之水土同

化吳茱萸三錢泡入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱

萸能煖膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分

解清濁也 和劑局方戊己丸治脾胃受溼下痢赤

白腹痛米穀不化用吳茱萸黃連白芍藥各一兩同

炒為末蒸餅丸梧子大每服二三丸米飲下

簡誤

陽厥似陰手足雖逆冷而口多渴喜飲水大小便秘
結小便或通亦赤澀短少此火極似水守真所謂禁
慄如喪神守皆屬於火之謂耳此與桂附乾薑之類
同忌嘔吐吞酸屬胃火者不宜用欬逆上氣非風寒
外邪及冷痰宿水所致不宜用腹痛屬血虛有火者
不宜用赤白下痢病名滯下因暑邪入於腸胃而非
酒食生冷停滯積垢者不宜用小腸疝氣非驟感寒

邪及初發一二次者不宜用霍亂轉筋由於脾胃虛弱冒暑所致而非寒溼生冷干犯腸胃者不宜用一切陰虛之證及五臟六腑有熱無寒之人法所咸忌檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白

疏○檳榔得天之陽氣地之金味故味辛氣溫無毒大明言澀元素言苦以其感盛夏之火氣耳氣薄味厚陽中微陰降也入手足陽明經夫足陽明為水穀

之海手陽明為傳道之官二經相為貫輸以運化精
微者也二經病則水穀不能以時消化羈留而成痰
癖或溼熱停久則變生諸蟲此藥辛能散結破滯苦
能下泄殺蟲故主如上諸證也甄權宣利五臟六腑
壅滯破胸中氣下水腫治心痛積聚日華子下一切
氣通關節利九竅健脾調中破癥結李珣主賁豚氣
五膈氣風冷氣脚氣宿食不消皆取其辛溫走散破
氣墜積能下腸胃有形之物耳

主治參互

同草果枳實橘皮治食瘧加三稜蓬茂礬紅紅麴山
查麥蘖消一切堅硬肉食及諸米麪生冷食積成塊
作痛 同黃連藕豆蓮肉橘紅白芍藥紅麴烏梅葛
根枳殼治滯下後重 同雷丸使君子白蕪荑蘆薈
肉豆蔻胡黃連治小兒疳蚘 同棟根鶴蟲錫灰薏
苡根貫衆烏梅治一切寸白蟲 同蒼朮草果青皮
甘草治山嵐瘴氣發瘧 直指方心脾作痛雞心櫟

榔高良薑各一錢半陳米百粒同以水煎服之 廣
利方脚氣衝心悶亂不識人用白檳榔十二分為末
分二服空心煖小便調下日二服 十便良方蟲痔
裏急檳榔為末每日空心以白湯調二錢 千金方
寸白蟲病檳榔二七枚為末先以水二升半煮檳榔
片取一升空心調末方寸匕服之經日蟲盡出未盡
再服以盡為度

簡誤

檳榔性能墜諸氣至於下極病屬氣虛者忌之脾胃
虛雖有積滯者不宜用下利非後重者不宜用心腹
痛無留結及非蟲攻咬者不宜用瘡非山嵐瘴氣者
不宜用凡病屬陰陽兩虛中氣不足而非腸胃壅滯
宿食脹滿者悉在所忌

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒
皰鼓鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸心大小腸大熱
心中煩悶

疏○梔子感天之清氣得地之苦味故其性無毒氣薄而味厚氣浮而味沉陽中陰也入手太陰手少陰足陽明經少陰為君主之官邪熱客之則五臟皆失所主清少陰之熱則五內邪氣自去胃中熱氣亦除面赤酒皸皴鼻者肺熱之候也肺主清肅酒熱客之即見是證於開竅之所延及於面也肺得苦寒之氣則酒熱自除而面鼻赤色皆退矣其主赤白癩瘡瘍者即諸痛痒瘡瘍皆屬心火之謂療目赤熱痛及胸

心大小腸大熱心中煩悶者總除心肺二經之火熱也此藥味苦氣寒瀉一切有餘之火故能主如上諸證

主治參互

仲景治傷寒汗吐下後虛煩不得眠及心中懊懣者有梔子豉湯用梔子十四枚香豉四合水煎服 入茵陳大黃湯治傷寒溼熱發黃腹脹梔子十四枚茵陳六兩大黃三兩水一斗先煮茵陳減六升內二味

煮取三升分三服小便當利尿如皂角汁狀正赤一宿腹減黃從小便出也 同甘草黃檗為梔子檿皮

湯亦治發黃身熱 同厚朴枳實為梔子厚朴湯治

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者得吐即愈 同鼠

矢作湯治大病後勞復小便不利者小便利即愈已

上皆仲景法 同連翹麥門冬竹葉燈心草生甘草

黃連能瀉心經有餘之火加赤茯苓木通滑石澤瀉

瀉小腸火 同桑黃或桑白皮黃芩甘草桔梗五味

子乾葛治酒熱傷肺發出鼻皴 同茵陳蒿滑石車

前子秦艽黃連連錢草首蓿治酒熱發黃 梅師方

治熱病後勞復及因交接後發動欲死不能語者梔

子三十枚水三升煎一升服令微汗 救急方治湯

盪火傷梔子末和雞子清濃塗之 丹溪方治胃脘

火痛山梔七枚炒水一盞煎七分入生薑汁飲之立

止

簡誤

梔子稟至苦大寒之氣苦寒損胃而傷血凡脾胃虛弱者忌之血虛發熱者忌之性能瀉有餘之火心肺無邪熱者不宜用小便不通由於膀胱虛無氣以化而非熱結小腸者不宜用瘡瘍因氣血虛不能收斂則為久冷敗瘡非溫煖補益之劑則不愈此所謂既潰之後一毫寒藥不可用是也世人又以治諸血證不知血得熱則行得寒則凝瘀血凝結於中則反致寒熱或發熱勞嗽飲食減少為難療之病凡治吐血

法當以順氣為先蓋血隨氣而行氣降則火降火降則血自歸經不求其止而止矣此治療之要法不可違也

騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積

血金瘡生肉

舊與紫釰同條今分出

疏○騏驎竭稟土氣而兼水化故味甘鹹氣平無毒丹房鑑源云稟於熒惑之氣生於湯石之陰其色赤象火而味鹹則得陰氣也氣薄味厚陰也降也入足

厥陰手少陰經甘主補鹹主消散瘀血生新血之要藥故主破積血金瘡止痛生肉主五臟邪氣者即邪熱氣也帶下者溼熱傷血分所致也甘鹹能涼血除熱故悉主之蘇恭主心腹卒痛李珣以之治傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血聚者誠為此耳

此藥產外

國極難得真者理傷折有奪命之功

主治參互

同乳香沒藥自然銅麻皮灰狗頭骨煨存性麝蟲黃

荊子骨碎補治一切打撲損傷 同髮灰乳香沒藥

片腦輕粉象牙末紅粉霜為細末摻一切金瘡及腫

毒生肌止痛 廣利方金瘡出血騏驎竭末傳之立

愈 醫林集要產後血衝心胸喘滿命在須臾用血

竭沒藥各一錢研童便和酒調服 究原方收斂瘡

口血竭末一字龍腦少許大棗燒灰半錢同研津調

塗之 摘玄方胸中血塊血竭沒藥各一兩滑石牡

丹皮各一兩同煮過為末醋糊丸梧子大空心服之

醫林集要嵌甲疼痛血竭末傳之

簡誤

凡使勿用海母血真相似只是味鹹并腥氣騏驎竭
味微鹹甘似梔子氣也又云嚼之不爛如蠟者為上
凡血病無瘀積者不必用日華子云此藥性急不可多
使却引膿用時勿與衆藥同研化作飛塵也

龍腦香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪氣風溼
積聚耳聾明目去目赤膚翳

疏○龍腦香稟火金之氣以生本經味辛苦氣微寒
無毒其香為百藥之冠凡香氣之甚者其性必溫熱
李珣言溫元素言熱是矣氣芳烈味大辛陽中之陽
升也散也性善走竅開竅無往不達芳香之氣能辟
一切邪惡辛熱之性能散一切風溼故主心腹邪氣
及風溼積聚也耳聾者竅閉也開竅則耳自聰目赤
膚翳者火熱甚也辛溫主散能引火熱之氣自外而
出則目自明赤痛膚翳自去此從治之法也別錄又

主婦人難產者取其善走開通關竅之力耳

主治參互

同乳香沒藥雄黃紅藥子烏雞骨白及白皺桑礪城
牛黃傳一切疔腫癰疽神效 聖濟總錄目生膚翳
龍腦為末日點三五度 御醫院方頭目風熱上攻
用龍腦末半兩南蓬砂末一兩頻嚙兩鼻 瀕湖集
簡方風熱喉痺燈心一錢黃檗五分並燒存性白礬
七分煨過片腦三分為末每以一二分吹患處此陸

一峰家傳絕妙方也 又方鼻中息肉垂下者用片
腦點之自入 夷堅志傷寒舌出過寸者梅花片腦
半分為末摻之隨手而愈 又方中風牙噤無門下
藥者開關散措之五月五日午時用龍腦天南星等
分為末每以一字措齒二三十遍其口自開 經驗
方痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透
者用龍腦一錢細研旋以猪心血丸灸子大每服一
丸紫草湯下少時心神便定得睡發瘡 總微論用

獷猪第二番血清半杯紫草汁半杯和勻入龍腦一分溫服良久下瘀血一二行瘡即紅活此治痘瘡黑
蟹候醫所不治者百發百中

簡誤

宗奭云此物大通利關膈熱塞大人小兒風涎閉塞
及暴得驚熱甚為濟用然非常服之藥震亨云龍腦
屬火世知其寒而通利未達其熱而輕浮飛越喜其
香而貴重動輒與麝同為桂附之助然人之陽易動

陰易虧不可不思杲曰龍腦入骨風病在骨髓者宜
用之為引經若風在血脈肌肉輒用腦麝反引風入
骨髓如油入麪莫之能出也觀三公之言則龍腦之
為害可知凡中風非外來之風邪乃因氣血虛而病
者忌之小兒吐瀉後成驚者為慢脾風切不可服急
驚屬實熱可用慢驚屬虛寒不可用眼目昏暗屬肝
腎虛者不宜入點藥設誤點之必致昏暗難療

蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫

行毒去三蟲化食逐寸白散腸中噉噉喘息

疏○蕪荑稟金氣而生於春陽之令本經味辛氣平
無毒甄權加苦李珣加溫詳其功用應是苦辛溫平
之藥非辛溫則不能散五臟皮膚骨節中邪毒氣非
苦平則不能去三蟲化食逐寸白療腸中噉噉喘息
然察其所主雖能除風邪淫氣之為害而其功則長
於走腸胃殺諸蟲消食積也故小兒疳瀉冷痢為必
資之藥

主治參互

同肉豆蔻胡黃連盧會使君子青黛五穀蟲雷丸檳榔橘皮治小兒疳熱瀉痢及腹大羸瘦面黃好喫泥土 本事方制殺諸蟲生蕪荑生檳榔各四兩為末蒸餅丸如梧子每服二十九丸白湯下 錢氏小兒直訣疳熱有蟲瘦悴久服充肌用蕪荑一兩黃連一兩為末豬膽汁七枚和入盥內飯上蒸之一日蒸一次九蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸菉豆大每服五

七丸至二十九丸米飲下 危氏得效方蟲牙作痛以
蕪荑仁安蛀孔中及縫中甚效 入藥用大者小者
即榆莢不堪入藥 除疳證殺蟲外他用甚稀故不
著簡誤

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬
嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安
胃止風痛

疏○枳殼氣味所主與枳實大畧相同但枳實形小

其氣全其性烈故善下達如少年猛悍之將勇往直前而一無回顧者也枳殼形大其氣散其性緩故其行稍遲是以能入胸膈肺胃之分及入大腸也其主風痒麻痺通利關節止風痛者蓋肺主皮毛胃主肌肉風寒溼入於二經則皮膚瘙痒或作痛或麻木此藥有苦泄辛散之功兼能引諸風藥入於二臟故為治風所需風邪既散則關節自然通利矣其療勞氣咳嗽背膊悶倦者蓋亦指風寒鬱於上焦則肺氣滯

而為悶倦咳嗽經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之枳
殼味苦能泄至高之氣故主之也又肺與大腸為表
裏風邪入肺則并入大腸風熱相搏而為腸風下血
苦寒下泄之氣則血熱清而風自除矣其主散留結
胸膈痰滯逐水消脹滿安胃諸證悉與枳實相同第
其氣稍緩耳

主治參互

同蘇子橘皮桔梗木香白豆蔻香附治上焦壅氣脹

滿因於寒 同黃連槐花乾葛防風荊芥芍藥黃芩
當歸生地黃地榆側柏葉治腸風下血初起者神效
同荊芥苦參防風蒼耳草敗蒲煎湯沐浴治風疹
作痒 同檳榔芍藥黃連升麻葛根甘草紅麴滑石
治滯下裏急後重 得人參麥冬治氣虛大便不快
同肉桂治右脇痛

簡誤

枳殼泄肺能損至高之氣肺氣虛弱者忌之脾胃虛

中氣不運而痰壅喘急者忌之咳嗽不因於風寒入肺氣壅者服之反能作劇咳嗽陰虛火炎者服之立致危殆一槩胎前產後咸不宜服今世多用以治婦人胎氣不安或至八九月為易產之劑動輒資用殊不知婦人懷孕全賴氣血以養胎氣血充足則胎自易產且娠婦至八九月精神困倦四肢軟弱飲食減少動息喘促何莫非虛弱之證而更用此耗散之藥耶正經所謂損不足而虛其虛豈不大謬哉古方有

瘦胎飲者為湖陽公主而設以彼奉養太過其氣必實故用此以耗其有餘之氣則胎易產今人不知古人立方之意一概濫施誤甚誤甚

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止澹洩明目

疏○枳實感天地苦寒之氣以生故其味苦氣寒無

毒別錄雷公加酸甄權加辛察其功用必是苦為最而酸辛次之氣味俱厚陰也入足陽明太陰經細詳神農主治與本藥氣味大不相侔究其所因必是枳殼所主蓋二物古文原同一條後人分出時誤入耳其別錄所主除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止瀉洩者是其本分內事皆足陽明太陰受病二經氣滯則不能運化精微而痰癖停水結實脹滿所自來矣胃之上口名曰

賁門賁門與心相連胃氣壅則心下亦自急痞痛邪
塞中焦則升降不舒而氣上逆肝木鬱於地下則不
能條達而脇痛得其破散衝走之力則諸證悉除所
以仲景下傷寒腹脹實結者有承氣湯胸中痞痛者
有陷胸湯潔古療心下痞滿者有枳朮丸壅滯既去
則胃氣自安而溲洩亦止矣末云明目者經曰目得
血而能視氣旺乃能生血損氣破散之性豈能明目
哉無是理也

主治參互

同三稜蓬茂青皮檳榔為消磨堅積之劑然須能食
脾胃健者宜之 同白术橘皮厚朴甘草砂仁為枳
朮丸治心下痞滿因於食 入陷胸湯治傷寒寒熱
結胸 入大小承氣湯治傷寒熱邪入裏結實脹滿
痛不可當數日不更衣者

簡誤

此藥性專消導破氣損真觀朱震亨云瀉痰有衝牆

倒壁之力其為勇悍之氣可知凡中氣虛弱勞倦傷脾發為痞滿者當用補中益氣湯補其不足則痞自除此法所當忌也脹滿非實邪結於中下焦手不可按七八日不更衣者必不可用挾熱下痢亦非燥糞留結者必不可用傷食停積多因脾胃虛不能運化所致慎勿輕餌如元氣壯實有積滯者不得已用一二劑病已即去之即潔古所製枳朮丸亦為脾胃有積滯者設積滯去則脾胃自健故謂之益脾胃之藥

非消導之外復有補益之功也時醫不識病之虛實藥之補瀉往往概施損人真氣為厲不淺設誤投之雖多服參耆補劑亦難挽其刻削之害也世人多蹈其弊故特表以為戒

厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃

疏○厚朴稟地二之氣以生兼得乎春陽之氣而成
故其味苦其氣溫甄權苦辛大熱應是辛熱苦溫之
藥辛熱太過則其性宜有毒以其得陽氣之正故無
毒耳氣味俱厚陽中之陰降也入足太陰手足陽明
經其主中風傷寒頭痛寒熱氣血痺死肌者蓋以風
寒外邪傷於陽分則為寒熱頭痛風寒溼入腠理則
氣血凝澀而成痺甚則肌肉不仁此藥辛能散結苦
能燥溼溫熱能祛風寒故悉主之也別錄又主溫中

消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢心煩滿者何莫非脹胃氣逆壅滯及痰飲留結飲食生冷所致得此下洩開通溫熱煖胃則諸證不求其止而止矣至於淋露雖屬下焦為病然多因胃家溼熱下流三蟲亦腸胃溼熱所生若能燥溼殺蟲故亦主之也本經又主驚悸及別錄除驚去留熱者皆非其所宜驚悸屬心虛於脾胃絕無相干氣味大溫之藥又豈能去留熱哉至益氣厚腸胃蓋亦指

邪氣去正氣自益之謂積滯消腸胃自厚之意耳非
消散之外復有補益之功也用者詳之

主治參互

同陳皮枳殼麥蘖草果山查砂仁礬紅治傷食腹脹
同橘皮黃連甘草蒼白朮葛根治溼熱作瀉 同

檳榔木香黃連滑石橘皮甘草白芍藥治滯下初起
同白朮人參白芍藥茯苓消腹脹 佐生薑橘皮

藿香砂仁半夏止胃寒嘔吐 同三稜蓬茂檳榔人

參青皮治積年冷癖堅塊 同蒼朮橘皮甘草為平

胃散治胸中敦厚之氣使飲食倍增 聖惠方治痰

壅嘔逆心胸滿悶不下飲食用厚朴一兩薑汁炙黃

為末米飲調下二錢七 張仲景金匱方治腹脹脈

數厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水一斗二

升煎取五升入大黃四兩再煎取三升溫服一升轉

動更服不動勿服 又七物厚朴湯治腹痛脹滿用

厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚枳實五枚桂二

兩生薑五兩以水一斗煎取四升溫服八合日三嘔
者加半夏五合

簡誤

厚朴氣味辛溫性復大熱其功長於泄結散滿溫煖
脾胃一切飲食停積氣壅暴脹與夫冷氣逆氣積年
冷氣入腹腸鳴虛吼痰飲吐沫胃冷嘔逆腹痛泄瀉
及脾胃壯實之人偶感風寒氣實人誤服參耆致成
喘脹誠為要藥然而性專消導散而不收畧無補益

之功故凡嘔吐不因寒痰冷積而由於胃虛火氣炎
上腹痛因於血虛脾陰不足而非停滯所致泄瀉因
於火熱暴注而非積寒傷冷腹滿因於中氣不足氣
不歸元而非氣實壅滯中風由於陰虛火炎猝致僵
仆而非西北真中寒邪傷寒發熱頭疼而無痞塞脹
滿之候小兒吐瀉乳食將成慢驚大人氣虛血槁見
發膈證老人脾虛不能運化偶有停積娠婦惡阻水
穀不入娠婦胎升眩暈娠婦傷食停冷娠婦腹痛瀉

利娠婦傷寒傷風產後血虛腹痛產後中滿作喘產
後洩瀉反胃已上諸證法所咸忌若誤投之輕病變
重重病必危世人不究其原一概濫用雖或一時未
見其害而清純沖和之氣默為之耗矣可不慎哉

茗苦櫟茗味甘苦微寒無毒主癰瘡利小便去痰熱渴
令人少睡 苦櫟主下氣消食

疏○茗稟土中之清氣兼得春初生發之意本經味
甘氣微寒無毒藏器言苦然亦有不苦者氣薄味厚

陰中微陽降也入手太陰少陰經太陰為清肅之臟
喜涼而惡熱熱則生痰而津液竭故作渴也癰瘡者
大腸積熱也小便不利者小腸熱結也甘寒入心肺
而除熱則津液生痰熱解臟氣既清腑病不求其止
而止矣令人少睡者蓋心藏神神昏則多睡清心經
之熱則神常自惺寂故不寐也下氣消食者苦能下
泄故氣下火降而兼滌除腸胃則食自消矣

主治參互

同黃連酸棗仁生用通草蓮實治多睡好眠 同當
歸川芎烏梅黑豆生地黃土茯苓甘菊花治頭痛因
於血虛有火者 直指方熱毒下痢蠟茶為末密水
煎服白痢以薑汁同水煎服兩三服即愈

簡誤

凡茶之種類極多方宜大異要皆以味甘不澀氣芬
如蘭摘於夏前者為良夫茶稟天地至清之氣生於
山谷磽瘠砂土之中不受纖芥穢滓專感雲露之氣

以為滋培故能滌腸胃一切垢膩寧非木中清貴之
品哉昔人多以其苦寒不利脾胃及多食發黃消瘦
之說此皆語其粗惡苦澀品類最下者言之耳昔雅
州蒙山出一種茶服四兩即為地僊豈有味甘氣芬
者飲之反致疾耶但苦澀野氣葉痿莖枯非道地所
產者服之不利心脾故不宜飲酒後不宜用能成飲
證

山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒

溼痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞
目黃耳聾面皯溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九
竅止小便利久服輕身明目強力長年

疏○山茱萸感天地春生之氣兼得木之酸味神農
氣平別錄微溫總言其得春氣之正耳岐伯甄權加
辛然嘗其味必是酸多辛少入足厥陰足少陰經陽
中之陰降也其治心下邪氣寒熱腸胃風邪寒熱頭
風風氣去來鼻塞面皯者皆肝腎二經所主二經虛

熱故見前證肝為風木之位經曰諸風掉眩屬肝木
此藥溫能通行辛能走散酸能入肝而斂虛熱風邪
消散則心下腸胃寒熱自除頭目亦清利而鼻塞面
皤悉愈也逐寒溼痺者經曰邪之所湊其氣必虛總
藉其辛溫散結行而能補也至於三蟲亦腸胃溼熱
所生溼去則蟲自除能溫中則氣自下汗自出矣凡
四時之令春氣煖而生秋氣涼而殺萬物之性喜溫
而惡寒人身精氣亦賴溫煖而後充足況肝腎在下

居至陰之位非得溫暖之氣則孤陰無以生此藥正入二經氣溫而主補味酸而主斂故精氣益而陰強也精益則五臟自安九竅自利又腎與膀胱為表裏膀胱虛寒則小便不禁耳為腎之外竅腎虛則耳聾肝開竅於目肝虛則邪熱客之而目黃二經受寒邪則為疝瘕二臟得補則諸證無不瘳矣輕身強力長年者益精安五臟之驗也

主治參互

同菟絲子肉蓯蓉巴戟天鹿茸牛膝白膠車前子枸
杞子生地黃沙苑蒺藜麥門冬能添精固髓煖腰膝
益陽道令人有子 同人參五味子牡蠣益智子治
老人小便淋瀝及遺尿 同人乳沙苑蒺藜熟地黃
人參麥門冬牛膝甘菊花治腦骨痛腦為髓之海髓
足則腦痛自除 同石菖蒲甘菊花地黃黃蘗五味
子治腎虛耳聾 同杜仲牛膝地黃白膠山藥治腎
虛腰痛 入六味地黃丸為腎虛而有溼熱者所須

簡誤

命門火熾強陽不痿者忌之膀胱熱結小便不利者
法當清利此藥味酸主斂不宜用陰虛血熱不宜用
即用當與黃蘗同加

紫葳味酸微寒無毒主婦產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒
熱羸瘦養胎

疏○紫葳即凌霄花也稟春氣以生故其味酸氣微
寒無毒花開於夏而色赤味應帶苦入肝行血之峻

藥故主婦人產乳餘疾及崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦
諸證至於養胎決非其性所宜用者慎之

主治參互

同當歸紅花川芎牛膝地黃延胡索桃仁蘇方木五
靈脂治壯實婦人經閉 普濟方嬰兒百日內無故
口青不飲乳用凌霄花大藍葉芒硝大黃等分為末
以羊髓和丸梧子大每研一九乳送下便能喫乳熱
者可服寒者忌之

簡誤

紫葳長於破血消瘀凡婦人血氣虛者一概勿施胎前斷不宜用

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立瘥

疏○胡桐淚稟地中至陰之氣而兼水化故味鹹苦氣大寒無毒氣味俱厚陰中之陰也入足陽明經經曰熱淫於內治以鹹寒又曰在高者因而越之苦以

湧吐寒以勝熱故主大毒熱心腹煩滿取吐而效也
牛馬性熱而又犯熱病所以急黃黑汗也鹹寒能除
大熱故亦主之曰華子以之治風蟲牙齒痛李珣謂
其能治骨槽風齒蠶元素言療癰非此不能除皆資
其苦能殺蟲鹹能入骨軟堅大寒能除極熱之用耳
主治參互

聖惠方牙疼出血胡桐淚半兩研入麝香少許夜夜
貼之 又方牙疳宣露膿血臭氣者胡桐淚一兩杓

杞根一升每用五錢煎水熱嗽 聖濟總錄牙齒蟲
黑乃腎虛也胡桐淚一兩丹砂半兩麝香一分為末
搽之除口齒藥外他用甚稀故不著簡誤

猪苓味甘苦平無毒主痃瘰解毒蠱症不祥利水道久
服輕身耐老

疏○猪苓稟戊土之陽氣得風木之陰氣本經謂其
味甘應兼淡苦其氣平而無毒氣味俱薄降也陽中
陰也入足太陽足少陰經其主痃瘰者瘰必由暑暑

必兼溼淡以利竅引暑溼之氣從小便出所以分消之也淡滲之性故利水道溼勝則身重溼去則身輕利竅之藥必能走泄精氣其曰久服耐老必無是理矣解蠱毒症不祥義將安出亦未可盡信也

主治參互

入五苓散為除溼之要藥 佐白芍藥白茯苓人參橘皮朮澤瀉治水腫之屬陽分者 佐白芍藥生地黃桑寄生桑根白皮茯苓澤瀉琥珀石斛薏苡仁肉

桂治水腫之屬陰分者均為要藥其功長於利水故善除溼

簡誤

寇宗奭曰猪苓利水之功多久服必損腎氣昏人目
潔古曰淡滲太燥能亡津液無溼證勿服皆確論也
有溼尚宜暫用久服斷乎不可

烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食
不消天行疫癘膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小

兒腹中諸蟲

疏○烏藥稟地二之氣以生故味辛氣溫無毒然嘗其味亦帶微苦氣亦微香氣厚於味陽也入足陽明少陰經其主中惡心腹痛疰忤鬼氣天行疫瘴者皆足陽明受病陽明開竅於口鼻凡邪惡鬼忤與夫疫瘴之氣侵人悉從口鼻而入此藥辛溫煖胃辟惡散邪故能主諸證也胃煖則宿食自消辛散則蠱毒亦解又腎與膀胱為表裏虛則寒客之而冷氣攻衝背

薺辛溫能散寒邪其性又善下走則冷氣攻衝自止也性溫走泄故復能散婦人血凝氣滯微苦而辛故又能療小兒腹中諸蟲也

主治參互

同沉香木香白豆蔻香附橘皮檳榔治婦人氣實暴氣壅脹 濟生方治七情鬱結上氣喘急用四磨湯降中兼升瀉中帶補其方以人參烏藥沉香檳榔各磨濃汁七分煎細細嚥之和劑局方烏沉湯治一

切氣一切冷補五臟調中壯陽煖腰膝去邪氣冷風
麻痺膀胱腎間冷氣攻衝背脊俛仰不利風水毒腫
吐瀉轉筋癰瘰刺痛中惡心腹痛鬼氣疰忤天行疫
瘴婦人血氣痛用天台烏藥一百兩沉香五十兩人
參三兩炙甘草四兩為末每服半錢薑鹽湯空心點
服

簡誤

烏藥辛溫散氣病屬氣虛者忌之世人多以香附同

用治女人一切氣病不知氣有虛有實有寒有熱冷氣暴氣用之固宜氣虛氣熱用之能無貽害耶以故婦人月事先期小便短赤及咳嗽內熱口渴乾舌苦不得眠一切陰虛內熱之病皆不宜服

沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中翳暈痛膚赤

疏○沒藥稟金水之氣以生故味苦平無毒然平應作辛氣應微寒氣薄味厚陰也降也入足厥陰經凡

惡瘡痔漏皆因血熱瘀滯而成外受金刃及杖傷作瘡亦皆血肉受病血肉傷則瘀而發熱作痛此藥苦能泄辛能散寒能除熱水屬陰血亦屬陰以類相從故能入血分散瘀血治血熱諸瘡及卒然下血證也肝開竅於目目得血而能視肝經血熱則目為赤痛膚翳散肝經之血熱則目病除矣

主治參互

同延胡索乳香乾漆鼈甲琥珀為末治產後血暈有

神效 加人參澤蘭生地益母草蘇木作湯送前藥

治兒枕痛及惡露未盡腸痛寒熱等證立效 同乳

香白及白斂紫花地丁半枝蓮夏枯草忍冬藤連翹

甘菊貝母治一切癰疽疔腫 同乳香當歸牡丹皮

牛膝續斷川芎番降香穿山甲治內傷胸脇骨痛

入一切膏藥能消毒止痛長肉 御藥院方筋骨損

傷米粉四兩炒黃入沒藥乳香末各半兩酒調成膏

攤貼之 奇效良方金刃所傷未透膜者乳香沒藥

各一錢以童子小便半盞酒半盞溫化服之 圖經
本草婦人腹痛內傷疔刺沒藥末一錢酒服便止又
治婦人血暈方同 婦人良方產後惡血沒藥血竭
末各一錢童便溫酒各半盞煎沸服良 危氏得效
方女人異疾月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先
將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯調下即愈

簡誤

孕婦不宜服凡骨節痛與夫胸腹脇肋痛非瘀血停

留而因於血虛者不宜用產後惡露去多腹中虛痛者不宜用癰疽已潰不宜用目赤膚翳非血熱甚者不宜用大概其功長於通滯血滯則氣亦壅氣血壅滯則經絡滿急經絡滿急故發腫作痛打撲踉蹌亦傷經絡血分血氣不行故壅滯作腫痛也沒藥善通壅滯之血血行則氣亦行氣血流通則腫痛自止矣故為諸瘡癰及金瘡杖瘡跌撲傷損腹中血結作痛之要藥而不主諸虛也

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰

疏○安息香稟火金之氣而有水故味辛苦氣平而
芬香性無毒氣厚味薄陽也入手少陰經少陰主藏
神神昏則邪惡鬼氣易侵芬香通神明而辟諸邪故
能主鬼疰惡氣也

主治參互

同鬼臼犀角牛黃丹砂乳香蘇合香龍齒雄黃麝香
治鬼疰尸疰殺癆蟲寐魘暴亡及大人小兒卒中邪

惡氣 奇效良方小兒驚邪安息香一豆許燒之自

除

簡誤

病非關邪惡氣侵犯者不宜服

仙人杖味鹹平

一云冷

無毒主噦氣嘔逆辟瘧小兒吐乳

大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又
主痔病燒為末服方寸匕

疏○仙人杖此笋之將成竹時立死者得笋之氣已

過稟竹之性未全故味鹹氣平無毒其功用在竹茹
竹黃之間所主噦氣嘔逆小兒吐乳辟疳大人吐食
痔瘡者竹茹之用也療小兒驚癇及夜啼者竹黃之
用也雖其形已痿而其性尚存故能療諸證也 又
秘方用此蘸麻油於空室中燃之取滴下油塗癰疽
已潰長肉如神他用甚稀故無主治簡誤

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除疽蠱疥
癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤

疏○海桐皮稟木中之陰氣以生本經味苦氣平無
毒然詳其用味應帶辛氣薄味厚陰中陽也入足太
陰陽明經二經虛則外邪易入為霍亂中惡辛以散
之溼熱內侵為疳蠱久痢苦以泄之又脾胃主肌肉
溼熱浸淫則生蟲而為疥癬苦能殺蟲平即微寒溼
熱去而疥癬除矣其主漱齒洗目者亦取其苦寒殺
蟲辛平散風熱之意耳李珣以之治腰脚不遂血脈
頑痺腿膝疼痛之證其為辛苦之劑無疑矣

主治參互

續傳信方治腰膝痛不可忍用海桐皮二兩牛膝芎
藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二
兩生地黃十兩煎浸洗焙乾剉細以綿包裹入無灰
酒二斗浸之冬二七日夏一七日空心飲一盞每日
早午晚各飲一盞長令醺醺合時不得漆減禁毒食
此藥治因風溼溼熱流注下焦腰膝為病若因陰虛
血少火熾而得者勿服 同真川槿皮輕粉蛇牀子

山大黃為末傳癰疥

簡誤

腰痛非風溼者不宜用

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心
並以薑鹽同煎入疏氣藥良

疏○大腹皮即檳榔皮也其氣味所主與檳榔大畧
相同第檳榔性烈破氣最捷腹皮性緩下氣稍遲入
足陽明太陰經二經虛則寒熱不調逆氣攻走或痰

滯中焦結成膈證或溼熱鬱積酸味醋心辛溫煖胃
豁痰通行下氣則諸證除矣大腸壅毒以其辛散破
氣而走陽明故亦主之也

主治參互

同白朮茯苓車前子木瓜桑白皮五加皮豬苓澤瀉
薏苡仁蠱魚治水腫有效虛者加人參

簡誤

鳩鳥多集檳榔樹上凡用檳榔皮宜先洗去黑水復

以酒洗後以大豆汁再洗過曬乾入灰火煨用性與
檳榔相似病涉虛弱者概勿施用

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久
服輕身明目得所欲

疏○合歡稟土氣以生故味甘氣平無毒入手少陰
足太陰經土為萬物之母主養五臟心為君主之官
本自調和脾虛則五臟不安心氣躁急則遇事拂鬱
多憂甘主益脾脾實則五臟自安甘可以緩心氣舒

緩則神明自暢而歡樂無憂神明暢達則覺照圓通
所欲咸遂矣嵇叔夜養生論云合歡觸忿正此之謂
歟其主輕身明目及大明主消癰疽續筋骨者皆取
其能補心脾生血脈之功耳

主治參互

與白蠟同入膏能長肌肉續筋骨甚捷 獨行方肺
癰唾濁心胸甲錯取夜合皮一掌大水三升煎取一
半分二服 百一選方撲損折骨夜合樹皮去粗皮

炒黑色四兩芥菜子炒一兩為末每服二錢溫酒臥時服以滓外傳接骨神妙 子合橘核木瓜牛膝能治疝溼熱者加黃檗寒溼者加茴香子 氣味和平與病無忤故不著簡誤

五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳蜜肺藏風毒流溢皮膚作風溼癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡

疏○五倍子得木氣而兼金水之性其味苦酸澀氣

平無毒氣薄味厚斂也陰也入手太陰足陽明經本
經主齒宣疳蠱風溼癰瘡及小兒面鼻疳瘡者皆從
外治取其苦能殺蟲酸平能斂浮熱性燥能主風溼
瘡癢膿水五痔下血者大腸積熱也大腸與肺為表
裏肺得斂肅則大腸亦自清寧也藏器療腸虛泄利
日華子主生津液消酒毒時珍謂其斂肺降火化痰
飲止咳嗽消渴盜汗斂潰瘡金瘡收脫肛子腸墜下
者悉假其入肺清金收斂固脫之功耳

主治參互

同地骨皮小薊皮硝甘草苦參葱頭煎湯洗楊梅結
毒集靈方自汗盜汗用五倍子研末津調填臍中
縛定一夜即止化痰生津喻化丸用五倍子安大
鉢頭內用煮糯米粥湯浸蓋好安靜處七日後常看
待發芽黃金色又出黑毛然後將箸試之若透內無
硬即收入細瓦鉢中播如醬連鉢日中曬至上皮乾
了又播勻又曬曬至可丸方丸彈子大曬乾收用其

味甘酸能化一切膠痰 又方脾泄久利五倍子炒
半斤陳倉米炒一升丁香細辛木香各三錢川椒五
錢為末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉 和

劑局方玉鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真
陽不固溺有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺盜汗虛
煩食減乏力此方性溫不熱極有神效五倍子一斤
白茯苓四兩龍骨二兩為末水糊丸梧子大每服七
十丸食前鹽湯送下日三服 百一選方臟毒下血

五倍子不拘多少為末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿入瓶內煨存性為末每服一錢溫酒下直指方大腸痔疾五倍子煎湯薰洗或燒煙薰之自然收縮 三因方脫肛不收用五倍子末三錢入白礬少許水一碗煎湯洗之立效 婦人良方產後腸脫五倍子末摻之 博濟方風毒攻眼腫癢澀痛不可忍者或上下脣赤爛或浮翳瘀肉侵睛神效驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半為末每用二錢水二盞

銅石器內煎汁去滓乘熱洗大能明目去澀 楊子
建護命方牙齦腫痛五倍子兩許瓦焙研末以半錢
傳痛處片時唾去涎內服去風熱藥 端效方白口
惡瘡狀似木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛等
分為末以筒吹之 儒門事親赴筵散治口舌生瘡
五倍子蜜陀僧等分為末漿水漱過乾貼之院方加
晚蠶蛾 杏林摘要魚口瘡毒初起未成膿者用五
倍子炒黃研入百草霜等分以臘醋調塗患處一日

一夜即消 拔萃方一切金瘡五倍子降真香等分
炒研末傅之皮肉自痊

簡誤

五倍子性燥急而專收斂咳嗽由於風寒外觸者忌
之瀉利非腸虛脫者忌之咳嗽由於肺火實甚者忌
之若誤服之反致壅塞喘滿以其酸斂太驟火氣無
從泄越故耳

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天吊鎮心明目去諸

風熱療金瘡止血滋養五藏

疏○天竺黃竹之津氣結成其氣味功用與竹瀝大同小異第竹黃氣微寒而性亦稍緩故為小兒家要藥入手少陰經小兒驚風天吊諸風熱者亦猶大人熱極生風之候也此藥能除熱養心豁痰利竅心家熱清而驚自平主君安而五臟咸得滋養故諸證悉除也明目療金瘡者總取其甘寒涼血清熱之功耳

主治參互


同牛黃犀角丹砂茯神琥珀酸棗仁遠志鈎藤鈎治
小兒驚癇癰疾有痰者加牛膽南星貝母竹瀝屬虛
者去南星加人參 錢一方小兒驚熱天竺黃二錢
雄黃牽牛末各一錢研勻麪糊丸粟米大每服三五
丸薄荷湯下除小兒驚癇痰熱外無別用故不著簡
誤

蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚翳赤澀多眵淚消
目中赤脈小兒麤豆及疳氣攻眼

疏○蜜蒙花稟土氣以生其蒞萌於冬而開於春故
氣平微寒味甘而無毒為厥陰肝家正藥觀本經所
主無非肝虛有熱所致蓋肝開竅於目目得血而能
視肝血虛則為青盲膚翳肝熱甚則為赤腫眵淚赤
脈及小兒豆瘡餘毒疳氣攻眼此藥甘以補血寒以
除熱肝血足而諸證無不愈矣好古謂其潤肝燥守
真以之治畏日羞明誠謂此也形與芫花相似但芫
花狹小而蜜蒙花差大為異用者宜詳辨之

主治參互

同空青木賊生地黃蟬蛻白蒺藜藜蘖精草決明子羚羊角治青盲翳障 同甘菊花枸杞子生地黃白蒺藜藜蘖精草治肝腎虛目不能遠視 同黃連赤芍藥防風荆芥穗黃檗甘菊花甘草龍膽草治風熱溼熱眼赤痛 同胡黃連白蕪荑使君子蟬蛻木賊蘆會治小兒疳積眼目不明 療眼疾外無他用故不著簡誤



神農本草經疏卷十三